



KOYUN / KEÇİ VEBASI (PPR)

Hastalık belirtileri:

Yüksek ateş, göz-burun akıntıları, ağızda yangı ve yaralar, diyare (ishal) ve pnömoni (zatürre) görülür.

Bulaşıcı ve genellikle akut seyirli bir hastalıktır. Etken virustur.

Salgınlar, yağışlı ya da soğuk kuru mevsimlerde sık görülür.

Hastalığın Önemi:

Yüksek oranda ölümle sonuçlandığından ekonomik kayıplar çok büyük olmaktadır. Viral bir hastalık olduğu için koruyucu hekimlik hizmetleri çok önemlidir. Aşılama mutlaka yapılmalıdır.



İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

Kıbrıs Şehitleri Cad. No:117, Konak/İzmir

TEL: (232) 465 10 63 | FAX: (232) 465 10 61

www.izmir-vho.org
izmvetoda@hotmail.com



Koyun / Keçi Vebası

En iyi korunma zamanında aşılama

Veteriner Hekimler Üreticilerin Yanında



İZMİR
VETERİNER HEKİMLER
ODASI



Hastalığın bulaşması:

Sindirim ve solunum yoluyla bulaşır. Bulaşma hasta ve duyarlı hayvanlar arasında direkt olarak oluşur. Virus, hasta hayvanların tüm salgılarıyla çevreye yayılır.

Mücadele ve Kontrol :

Koyun keçi vebası hastalığı, istisnai durumların dışında her zaman hastalıktan arı bölgelere hasta hayvan girişleri ile nakledilmektedir. Bu nedenle mücadelede hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz eder.

Küçük ruminantlarda hastalığın çıkmasından sonra hastalığın çevreye yayılması oldukça hızlıdır.

Hastalık görüldüğünde uygulanacak karantina tedbirleri ve hasta hayvanların imhası hastalığın yayılmasına engel olur.

Hastalığın tespit edildiği yerlerde, hastalık belirtisi görülmeyen fakat, olası bulaşma olacak hayvanlara çevreden merkeze olmak kaydıyla yapılacak aşı uygulamaları ile hastalığı kısa sürede kontrol altına almak mümkündür.

Hastalık:

Hastalıkta göz ve burun akıntıları oluşur. Başlangıçta sulu berrak daha sonra irinli bir özellik kazanan bu akıntılar, göz kapaklarının birbirine yapışmasına ve burun deliklerinde kabuklar oluşturarak hayvanın güç soluk almasına neden olur.

Ateşin başlangıcından 2-3 gün sonra ağızda, aşırı tükürük oluşumu ile birlikte lezyonlar görülür. Bunu sulu ve sıklıkla kanlı olabilen bir ishal izler ve beden ısısı düşer. Öksürük, abdominal solunum ve Pnömoni (Zatürre) görülebilir.

Ağır geçirilen vakalarda, hayvanlar ateşin başlangıcından sonraki 6-10 gün içinde sıvı kaybı ya da sık görülen bir komplikasyon olarak bronkopnömoni sonucu ölürlür.

