



## SÜT SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Sağımdan sonra ahırın kokusunun süte geçmemesi için süütün en kısa sürede ahırdan çıkarılmasına dikkat edilmelidir.

Sağıldığı anda 37°C olan süt sıcaklığı 1 saat içerisinde +10°C'ye 2 saat içinde +4°C ye düşürülerek mikropların üremesi engellenmelidir.



## KALİTELİ ÇİĞ SÜT NEDİR?

Sağlıklı bir hayvandan sağlıklı ve temiz koşullarda elde edilen kendine özgü renk, tat, yapı ve bileşime sahip, dışarıdan herhangi bir madde (su, soda) ilave edilmiş, bileşiminden herhangi bir madde (süt yağı) alınmamış süte KALİTELİ ÇİĞ SÜT denir.

Süütün kalitesi; içerdiği kuru madde oranı, yağ oranı ve somatik hücre sayısına göre belirlenir.

Somatik hücre sayısının yüksekliği hayvanın meme dokusuna mikroplar tarafından yapılan saldırıları göstermektedir. Somatik hücre sayısının aşırı yüksekliği ve bakteri varlığı ise ciddi verim kaybına neden mastitisin, özellikle dışarıdan fark edilmeyen ama olan subklinik mastitisin varlığına işaret etmektedir.



## İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Kıbrıs Şehitleri Cad. No:117 Kat:3 D:4  
Alsancak-İzmir  
Tel: +90 232 465 10 63  
Fax: +90 232 465 10 61  
e-posta: izmvetoda@hotmail.com  
www.izmir-vho.org



İZMİR  
VETERİNER  
HEKİMLERİ  
ODASI



# SAĞLIKLI SÜT



## SAĞIM HIJYENİ;

- Süt kalitesinin artırılması
- Sağım sonrası mikrobiyal bulaşmanın önlenmesi
- Mastitis başta olmak üzere salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi
- Tedavi masraflarının azaltılması ve hayvan kayıplarının önlenmesi
- Verim artışına katkıda bulunulması
- İnsan sağlığına katkıda bulunulması açısından

**ÖNEMLİDİR**



## SAĞIM YERLERİ NASIL OLMALIDIR?

- Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay olan düzgün zemin yapısına sahip olmalıdır.
- Ortam havadar olmalıdır.
- Atıkların kolay uzaklaştırılabildiği şekilde düzenlenmelidir.



## MASTITİSTEN KORUNMAK İÇİN!

- Sağım ekipmanlarının günlük temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmalıyız.
- Sağım hijyeni, meme temizliğine ve dezenfeksiyonuna dikkat etmeliyiz.
- Sağımdan sonra meme kanalları açık olduğu için bir süre daha yemlemeye devam etmekte fayda vardır.
- Mastitisi önlemek için doğuma 6-8 hafta kala hayvanı kuruya çıkarmalıyız.
- Veteriner Hekimin tavsiyesi dışında ilaç kullanmamalıyız.
- Düzenli aralıklarla sütleri kontrol etmeliyiz.
- Meme başını sağımdan önce sabunlu ılık suyla yıkayıp temiz, tek kullanımlık bez ya da kağıt havluyla kurulamalıyız.



## İNEĞİMİZİ MASTITİSTEN NASIL KORUYABİLİRİZ?

- Hijyenik ve doğru sağım yapılmalı
- Doğru ve dengeli beslemeye dikkat edilmeli
- Düzenli aralıklarla süt numunesi alıp mastitis (meme iltihabı) testi yaptırılmalı